

**栽培信息：长春花 胜利**  
**植物学名：Catharanthus roseus**  
**种子数：450粒/克**  
**发芽适温：25℃**  
**生长适温：24-27℃**



### 穴盘育苗阶段—6周

#### 第一阶段（第1-7天）：

选择pH值在5.5-5.8之间的无菌、少土基质。用蛭石轻轻覆盖种子，保持水分均匀一致，温度在24-27℃。长春花种子在完全黑暗的环境中更加容易萌发一致。

#### 第二阶段（第8-14天）：

种子萌发后，将穴盘移到温暖、明亮、通风良好的温室里。温度降至21-24℃。当第一片真叶出现时，轻施含有50-75ppm氮肥的平衡硝酸钙肥。补充光照有利于穴盘苗健康强壮。

#### 第三阶段（第15-30天）：

当植株长出更多的叶片时，继续保持温暖的条件，施100-150ppm的氮肥，必须维持EC值在0.7-0.8之间。两次浇水之间允许苗土稍微干燥，促进植株的健康、根系的强壮。最好是在早晨浇水，保证叶片在日落前干燥。

#### 第四阶段（第31-42天）：

此阶段适当减少水肥，准备移栽或运输。不要降温太多，因为温度低于18℃对长春花生长不利。

### 移栽到开花—5-6周

**移栽：**选择排水良好、pH值在5.5-5.8之间、低硝酸盐的基质。将植株小心的从穴盘中取出，以免损伤根茎，也要注意不要把植株栽很深，因为苗栽太深会导致立枯病的发生。

**施肥：**长春花不是喜肥性植物，而且EC值不应该超过1.0。施用含有100-150 ppm氮肥的硝酸钙肥。与三色堇相似，长春花对微量元素有着较高的需求。需施用含有较高硼元素的特殊肥料。不建议施用硝酸铵。

**温度：**长春花在强光温暖的条件下生长得最好。理想的温度是白天在24-27℃，夜间在20-22℃。在生长过程中要避免低温（18℃），因为这样会使叶片卷曲和萎黄。更低的温度（15℃）也会导致花斑的产生。

**病害：**长春花虫害问题少，但病害影响严重。黑根腐病和疫病是温室生产中的主要问题，最好的控制方式是良好的环境卫生。杀菌剂可以作为预防措施使用。但良好的栽培方法（作物在温暖的环境下生长，提供良好的空气流动，最适基质pH值、见干见湿的浇水原则）是最好的预防措施。

**生长调节剂：**长春花一般不需要使用植物生长调节剂。在高温高湿的环境下，植物生长调节剂被使用的概率很低，特别是邦奇（多效唑）。避免在温暖的天气里使用植物生长调节剂。使用邦奇会导致黑色的斑点发展到较老的叶子上。水分胁迫、适度的施肥率和强光照是控制高度的最好方法。

**市场：**长春花胜利系列长势均匀一致，植株直立向上性强，分枝性好。是盆栽、花袋和组合栽培的理想选择。长春花胜利系列适用于广泛的颜色搭配。

**上花时间：**单株栽种为移栽后五周；10cm盆栽为移栽后六周。